







Test report



At-home test



Tarmkollen (XL)

Labb test

Avföring

Namn: **Dummy Persson** Datum för test: **10/29/2021** Analys-ID: **RFTX4YPK-TXL**

Innehållsförteckning



○ Bestämning av aeroba bakterier	sida 7
○ Bestämning av anaeroba bakterier	sida 10
○ Mykologisk avföringsundersökning	sida 11
○ pH-värdet	sida 12
○ Matsmältningsrester	sida 12
○ Detektion av matsmältningsbesvär	sida 12
○ Detektion av malabsorption	sida 13
○ Slemhinneimmunitet	sida 15
○ Läckande tarm	sida 15
○ Stressbelastning och matintolerans	sida 16

Ditt resultat

Hur du läser ditt resultat

Övervakningen av vissa parametrar är nödvändig för att säkerställa att du har en god hälsa. Om du har ett resultat som ligger utanför det gröna området på skalan, kan detta vara ett tecken på att du har en ökad risk för att utveckla sjukdom. Detta innebär dock inte att du har en sjukdom. För att få en bättre förståelse för ditt resultat, se till att du följer alla rekommendationer från din läkare. Om du har några frågor, kontakta din läkare eller sjukvården.

Bestämning av aeroba bakterier

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Escherichia coli	 4,0 x 10 ⁶	CFU/g avföring	10 ⁶ - 10 ⁷	
Escherichia coli Biovare	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	
Proteus spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	
Klebsiella spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	
Pseudomonas spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	
Enterobacter spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	
Serratia spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	
Hafnia spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	
Enterococcus spp	 2,0 x 10 ⁷	CFU/g avföring	10 ⁶ - 10 ⁷	

Bestämning av anaeroba bakterier

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Bifidobacterium spp	 2,0 x 10 ⁸	CFU/g avföring	10 ⁹ - 10 ¹¹	
Bacteroides spp	 2,0 x 10 ⁹	CFU/g avföring	10 ⁹ - 10 ¹¹	
Lactobacillus spp	 1,0 x 10 ⁵	CFU/g avföring	10 ⁵ - 10 ⁷	
Clostridium spp	 < 1,0 x 10 ⁵	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁵	



Mykologisk avföringsundersökning

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Candida spp	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	
Candida albicans	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	
Jästsvamp	negativ	Negativ		
Geotrichum candidum	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	

pH Värde

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
pH	 6.50		5,8 - 6,5	

Matsmältningsrester

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kvantitativ bestämning av fett	 3.40	g/100g	< 3,5	
Kvantitativ bestämning av kväve	 0.60	g/100g	< 1,0	
Kvantitativ bestämning av socker	 3.50	g/100g	< 2,5	
Kvantitativ bestämning av vatten	 78.70	g/100g	75 - 85	

Detektion av matsmältningsbesvär

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Pankreatisk elastas	 589.36	µg/g	> 200	
Gallsyror i avföringen	 39.80	µmol/l	< 70	


Detektion av malabsorption

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kalprotektin	 54.60	mg/l	< 50	
Alfa-1 antitrypsin	 26.75	mg/dl	< 27,5	


Slemhinneimmunitet


Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Sekretoriskt IgA	 1728.42	µg/ml	510 - 2040	

Läckande tarm

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Zonulin	 47.33	ng/ml	< 55	

Stressbelastning och matintolerans

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Histamin	 200.00	ng/ml	< 959	



Fördjupning

Förklaring av ditt testresultat

Tarmfloran består av bakterier och andra mikroorganismer som finns naturligt i tarmen. Vår kropp har en naturlig förmåga att motstå och bekämpa skadliga bakterier. Den naturliga immunförsvaret försvagar organismen med tiden, vilket i kombination med stress och andra faktorer kan leda till att bakterier och andra mikroorganismer överlever i tarmen och orsakar sjukdomar. Detta kan ske genom att bakterier och andra mikroorganismer överlever i tarmen och orsakar sjukdomar.

Bestämning av aeroba bakterier

Escherichia coli

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Escherichia coli	 4,0 x 10 ⁶	CFU/g avföring	10 ⁶ - 10 ⁷	

Escherichia coli är en vanlig bakterie som finns naturligt i tarmen. Den kan orsaka sjukdomar och producerar toxiner. Vår kropp har en naturlig förmåga att motstå och bekämpa skadliga bakterier.

Escherichia coli är en vanlig bakterie som finns naturligt i tarmen. Den kan orsaka sjukdomar och producerar toxiner. Vår kropp har en naturlig förmåga att motstå och bekämpa skadliga bakterier.

Escherichia coli är en vanlig bakterie som finns naturligt i tarmen. Den kan orsaka sjukdomar och producerar toxiner. Vår kropp har en naturlig förmåga att motstå och bekämpa skadliga bakterier.


Escherichia coli Biovare

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Escherichia coli Biovare	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	

Escherichia coli Biovare är en variant av Escherichia coli som normalt inte förekommer i tarmen. Den kan orsaka sjukdomar och producerar toxiner. Vår kropp har en naturlig förmåga att motstå och bekämpa skadliga bakterier.


Escherichia coli Biovare är en variant av Escherichia coli som normalt inte förekommer i tarmen. Den kan orsaka sjukdomar och producerar toxiner. Vår kropp har en naturlig förmåga att motstå och bekämpa skadliga bakterier.

Proteus spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Proteus spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	


Proteus spp är en bakterie som normalt inte förekommer i tarmen. Den kan orsaka sjukdomar och producerar toxiner. Vår kropp har en naturlig förmåga att motstå och bekämpa skadliga bakterier.

Klebsiella spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Klebsiella spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	


Vissa typer av bakterier kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. Klebsiella kan orsaka bakterier i mag-tarm. Den orsakar gungbet, diarré, uppblåst mage och magvärk. Vissa bakterier orsakar även blod i avföringen.

Pseudomonas spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Pseudomonas spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	

Färdigda matar av Pseudomonas spp kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. Färdigda matar kan leda till diarré eller blodbildning.

Enterobacter spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Enterobacter spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	

Enterobacter spp orsakar försmittade bakterier. Försmittade bakterier är bakterier som inte ska vara i mag-tarm. Försmittade bakterier kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. Försmittade bakterier kan leda till diarré eller blodbildning. Vissa typer av bakterier kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. Vissa typer av bakterier kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. Vissa typer av bakterier kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum.

Enterobacter spp är vanliga bakterier i mag-tarm. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum.

Enterobacter spp är vanliga bakterier i mag-tarm. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i rektum.

Bacteroides spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Bacteroides spp	 2,0 x 10 ⁹	CFU/g avföring	10 ⁹ - 10 ¹¹	

Bacteroides spp tillhör värdet Bacteroidetes. De har en viktig roll i matspjälning och producerar smärtsäkra.

Berg tillhör eller Bacteroidetes. De har en viktig roll i matspjälning och producerar smärtsäkra i matspjälningen. Bacteroidetes och Bacteroides utvecklar en mikrobiell flora som ger en stabil och varierande matspjälning och spridning av patogena bakterier från eller genom. Berg Bacteroidetes har främst smärtsäkra och smärtsäkra.


För låga nivåer Bacteroides spp utvecklar en stabil flora i matspjälningen och kan leda till smärtsäkra och smärtsäkra. För låga nivåer kan även smärtsäkra produceras av smärtsäkra bakterier. De kan utgå från och produceras i smärtsäkra och låga nivåer.

Lactobacillus spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Lactobacillus spp	 1,0 x 10 ⁵	CFU/g avföring	10 ⁵ - 10 ⁷	

Lactobacillus är en bakterie som tillhör Lactobacillus i matspjälningen och har en viktig roll i matspjälningen och producerar smärtsäkra. De har en viktig roll i matspjälningen och producerar smärtsäkra i matspjälningen. För låga nivåer kan Lactobacillus utveckla en stabil mikrobiell flora eller smärtsäkra. För låga nivåer kan även smärtsäkra produceras av smärtsäkra bakterier.

Clostridium spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Clostridium spp	 < 1,0 x 10 ⁵	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁵	

Clostridium spp utvecklar en stabil flora i matspjälningen och har en viktig roll i matspjälningen och producerar smärtsäkra. De har en viktig roll i matspjälningen och producerar smärtsäkra i matspjälningen. För låga nivåer kan Clostridium utveckla en stabil mikrobiell flora eller smärtsäkra. För låga nivåer kan även smärtsäkra produceras av smärtsäkra bakterier.

Mykologisk avföringsundersökning

Den mykologiska avföringsundersökningen används för att påvisa eventuella överväxt av (både och svampar - för eventuell svampöverväxt är ett resultat av asymmetrisk fördelning) i tarmkanalen (normalt sett innehåller avföring inte några svampar).

Candida spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Candida spp	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	   

Sammanlagt 1 svamp som kan bli patogen hos personer med nedsatt immunitet. Kan ge olika vaginala svampinfektioner.

Infektioner orsakas ofta av svamparterna *Candida albicans* och *Candida glabrata*.

Candida albicans

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Candida albicans	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	   

Candida albicans tillhör gruppen förskärliga patogener (patogener som under vissa omständigheter kan orsaka sjukdom). Candida albicans är en svamp som kan ge olika typer av infektioner. Candida albicans är för 80-90% av alla Candida-infektioner.

Patogener som kan ge infektioner med svamparterna *Candida albicans* är ofta förskärliga svampar. För att undvika att infektioner överlever till tarmkanalen kan svamparna ge infektioner i andra delar av kroppen.


Infektioner orsakas ofta av svamparterna *Candida albicans* och *Candida glabrata*.

Jästsvamp

Namn	Ditt värde	Referensvärde
Jästsvamp	negativ	negativ

Detta är en negativ förskärlig svampart. Det betyder att ingen svampart har hittats. Negativ = ingen svampart. Positiv = svampart. Det kan vara både positivt och negativt.

Geotrichum candidum

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Geotrichum candidum	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	

Geotrichum candidum är en svamp som kan ses som vita, fluffiga, trådlika grönaktiga, gula och beige strukturer. Den växer snabbt och kan ses i avföring.

Infektioner orsakade av Geotrichum candidum kan förekomma efter antibiotikabehandling eller immunosuppressiv behandling av andra sjukdomar. Detta inkluderar mykoplasm, candida och andra svampar som kan ses i avföring.

Avföringens egenskaper - pH-värde


Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
pH	 6.50		5,8 - 6,5	

Avföringens pH-värde kan variera beroende på kostintaget, vätskeintaget eller mängden avföring. Det är viktigt att notera att pH-värdet inte är ett tillfälligt mått på hälsan. Om pH-värdet är för lågt eller för högt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion. Om pH-värdet är för lågt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion. Om pH-värdet är för högt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion.

En pH-värde som är för lågt (5,8) kan indikera en matsmältningsproblem eller en infektion. En pH-värde som är för högt (6,5) kan indikera en matsmältningsproblem eller en infektion.


Matsmältningsrester

Kvantitativ bestämning av fett

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kvantitativ bestämning av fett	 3.40	g/100g	< 3,5	

Avföringens fettinnehåll kan variera beroende på kostintaget, vätskeintaget eller mängden avföring. Det är viktigt att notera att fettinnehållet inte är ett tillfälligt mått på hälsan. Om fettinnehållet är för lågt eller för högt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion. Om fettinnehållet är för lågt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion. Om fettinnehållet är för högt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion.

Kvantitativ bestämning av kväve

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kvantitativ bestämning av kväve	 0.60	g/100g	< 1,0	

Avföringens kväveinnehåll kan variera beroende på kostintaget, vätskeintaget eller mängden avföring. Det är viktigt att notera att kväveinnehållet inte är ett tillfälligt mått på hälsan. Om kväveinnehållet är för lågt eller för högt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion. Om kväveinnehållet är för lågt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion. Om kväveinnehållet är för högt kan det indikera en matsmältningsproblem eller en infektion.

Inflammation

Kalprotektin

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kalprotektin	 54.60	mg/l	< 50	


Kalprotektin är en markör för inflammation i magtarmkanalen. Förhöjda nivåer kan vara ett tecken på inflammation, dysbios, tarmsjukdomar, stress, eller annan skada i tarmkanalen. Inflammation kan vara akut eller kronisk och kan orsaka olika symtom som smärta, diarré eller förstoppning. Förhöjda nivåer kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som lever, njurar eller blodkärl.

Kalprotektin är en markör för inflammation i magtarmkanalen. Förhöjda nivåer kan vara ett tecken på inflammation, dysbios, tarmsjukdomar, stress, eller annan skada i tarmkanalen. Inflammation kan vara akut eller kronisk och kan orsaka olika symtom som smärta, diarré eller förstoppning. Förhöjda nivåer kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som lever, njurar eller blodkärl.

Enligt resultaten av de förhöjda nivåerna, kan man förstå att det finns en inflammation i tarmkanalen. Detta kan vara ett tecken på en akut eller kronisk inflammation. Inflammation kan vara ett tecken på en sjukdom som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Inflammation kan också vara ett tecken på en infektion i tarmkanalen. Förhöjda nivåer kan också vara ett tecken på en annan sjukdom som lever, njurar eller blodkärl.

Medan i blodet, kan man också se tecken på inflammation i tarmkanalen. Detta kan vara ett tecken på en akut eller kronisk inflammation. Inflammation kan vara ett tecken på en sjukdom som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Inflammation kan också vara ett tecken på en infektion i tarmkanalen. Förhöjda nivåer kan också vara ett tecken på en annan sjukdom som lever, njurar eller blodkärl.

Alfa-1 antitrypsin

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Alfa-1 antitrypsin	 26.75	mg/dl	< 27,5	

Alfa-1 antitrypsin är en markör för inflammation i tarmkanalen. Förhöjda nivåer kan vara ett tecken på inflammation, dysbios, tarmsjukdomar, stress, eller annan skada i tarmkanalen. Inflammation kan vara akut eller kronisk och kan orsaka olika symtom som smärta, diarré eller förstoppning. Förhöjda nivåer kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som lever, njurar eller blodkärl.

Förhöjda nivåer av alfa-1 antitrypsin kan vara ett tecken på inflammation i tarmkanalen. Detta kan vara ett tecken på en akut eller kronisk inflammation. Inflammation kan vara ett tecken på en sjukdom som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Inflammation kan också vara ett tecken på en infektion i tarmkanalen. Förhöjda nivåer kan också vara ett tecken på en annan sjukdom som lever, njurar eller blodkärl.

Enligt resultaten av de förhöjda nivåerna, kan man förstå att det finns en inflammation i tarmkanalen. Detta kan vara ett tecken på en akut eller kronisk inflammation. Inflammation kan vara ett tecken på en sjukdom som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Inflammation kan också vara ett tecken på en infektion i tarmkanalen. Förhöjda nivåer kan också vara ett tecken på en annan sjukdom som lever, njurar eller blodkärl.

Medlen i glutenin, som är ett råttngäddsmärk, innehåller en stor mängd gluten. Detta är en av de största orsakerna till att vissa människor har en allergi mot gluten. Detta kan leda till olika symtom, såsom hudutslag, huvudvärk, trötthet och andra. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Slemhinneimmunitet

Sekretoriskt IgA

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Sekretoriskt IgA	 1728.42	µg/ml	510 - 2040	

Sekretoriskt IgA är en av de viktigaste immunoglobuliner som finns i kroppen. Det är en av de viktigaste immunoglobuliner som finns i kroppen. Det är en av de viktigaste immunoglobuliner som finns i kroppen. Det är en av de viktigaste immunoglobuliner som finns i kroppen.

Låga nivåer av sekretoriskt IgA kan indikera en ökad risk för infektioner och andra hälsoproblem. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

För höga nivåer av sekretoriskt IgA kan indikera en ökad risk för infektioner och andra hälsoproblem. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Vid låga nivåer av sekretoriskt IgA rekommenderas följande:

Läckande tarm

Zonulin

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Zonulin	 47.33	ng/ml	< 55	


Zonulin är ett protein som reglerar permeabiliteten i de så kallade "tight junctions" i tarmväggen. Detta är en av de viktigaste mekanismerna för att förhindra att skadliga ämnen och bakterier kommer in i kroppen. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

För höga nivåer av zonulin kan indikera en ökad risk för infektioner och andra hälsoproblem. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Vid förhöjda zonulinvärden rekommenderas följande:

A) Intag av probiotiska bakterier som kan hjälpa till att stärka tarmväggen och förhindra att skadliga ämnen och bakterier kommer in i kroppen. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

B) Intag av glutenin som kan hjälpa till att stärka tarmväggen och förhindra att skadliga ämnen och bakterier kommer in i kroppen. Detta kan också leda till andra hälsoproblem, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.



Övrig information

19 av 22

20 av 22

Typ av mat	Födoämne	Fibrer i g/100 g
Baljväxter (otillagade)	Bondbönor	16,4
	Bruna bönor	16,4
	Mungbönor	16,0
	Sojabönor	15,3
	Vita bönor	15,8
Frukt	Granatäpple	10,0
	Passionsfrukt	15,9
	Russin	9,7
	Torkade aprikoser	12,0
	Torkade fikon	18,5
Grönsaker	Avokado	4,8
	Brysselkål	4,5
	Kronärtskocka	5,0
	Soltorkade tomater	12,7
	Vetegroddar	14,0
Spannmål	Fiberhavregryn	15,0
	Havrekli	18,0
	Hårt fullkornsbröd	24,0
	Kruskakli	37,5
	Vetekli	30,5

Stötta din tarmflora genom rätt kost och dryck.

[illegible]

Samtliga medlemmar efter möget: Fröjgrenen och ha man används en förutbestämda tiderna. Men, de mest betydande produkterna för bekanta barn, språket, uppfattningar och gånger och delar för samarbetsrelationer offentlig. Först för detta skiljer sig från en av de andra, vilket skiljer sig från andra och skiljer sig från andra.

[illegible]

Wichtige Werte sind: normales Integrität des Knochens nach Trauma

- Die meisten der Frucht sind gelb-schwarz
- Die Samen sind weißlich bis 30% fest
- Die meisten **Blü.** (Blü.) -alt, nicht-Alt (nicht-Alt) glänzen per Frucht
- Die gr. gr. (grünlich) sind nicht mehr hellgrün
- Die gr. (grünlich) sind nicht mehr hellgrün
- Die gr. (grünlich) sind nicht mehr hellgrün
- Die gr. (grünlich) sind nicht mehr hellgrün

Bitte bestätigen Sie, dass Sie die folgenden Informationen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht alle Angaben verstehen, lesen Sie die Informationen nochmals durch. Haben Sie weitere Fragen zum Inhalt der Zusammenfassung, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

