






Test report



At-home test



Tarmkollen (Stora)

 Labb test

 Avföring

Namn: **Dummy Persson**

Datum för test: **10/29/2021**

Analys-ID: **IMDILG-A020**

Innehållsförteckning



○ Bestämning av aeroba bakterier	sida 7
○ Bestämning av anaeroba bakterier	sida 8
○ Mykologisk avföringsundersökning	sida 10
○ pH-värdet	sida 11
○ Matsmältningsrester	sida 11
○ Detektion av matsmältningsbesvär	sida 11
○ Slemhinneimmunitet	sida 14

Ditt resultat


Här du läser ditt resultat

Detta resultat för varje parameter är baserat på den avvikelse markeringen ligger från det gröna området på skalan. Om markeringen ligger inom det gröna området har du ett avvikande värde. Dessa parametrar kan inte lagra för tillgängliga för dig. I all fall ligger alla värden utöver på det gröna området, detta är helt normalt.


Bestämning av aeroba bakterier

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Escherichia coli	 $2,0 \times 10^6$	CFU/g avföring	$10^6 - 10^7$	
Escherichia coli Biovare	 $< 1,0 \times 10^4$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^4$	
Proteus spp	 $< 1,0 \times 10^4$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^4$	
Klebsiella spp	 $8,0 \times 10^7$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^4$	
Pseudomonas spp	 $< 1,0 \times 10^4$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^4$	
Enterobacter spp	 $< 1,0 \times 10^4$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^4$	
Serratia spp	 $< 1,0 \times 10^4$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^4$	
Hafnia spp	 $< 1,0 \times 10^4$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^4$	
Enterococcus spp	 $< 1,0 \times 10^4$	CFU/g avföring	$10^6 - 10^7$	

Bestämning av anaeroba bakterier

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Bifidobacterium spp	 $3,0 \times 10^9$	CFU/g avföring	$10^9 - 10^{11}$	
Bacteroides spp	 $5,0 \times 10^9$	CFU/g avföring	$10^9 - 10^{11}$	
Lactobacillus spp	 $< 1,0 \times 10^4$	CFU/g avföring	$10^5 - 10^7$	
Clostridium spp	 $< 1,0 \times 10^5$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^5$	


Mykologisk avföringsundersökning

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Candida spp	 $< 1,0 \times 10^3$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^3$	
Candida albicans	 $< 1,0 \times 10^3$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^3$	
Jästsvamp	negativ	Negativ		
Geotrichum candidum	 $< 1,0 \times 10^3$	CFU/g avföring	$< 1,0 \times 10^3$	

Slemhinneimmunitet

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Sekretoriskt IgA	 806.11	CFU/g avföring	510 - 2040	

pH Värde

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
pH	 7.80		5,8 - 6,5	


Matsmältningsrester


Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kvantitativ bestämning av fett	 4.10	g/100g	< 3,5	
Kvantitativ bestämning av kväve	 0.40	g/100g	< 1,0	
Kvantitativ bestämning av socker	 3.30	g/100g	< 2,5	
Kvantitativ bestämning av vatten	 81.40	g/100g	75 - 85	

Detektion av matsmältningsbesvär

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Pankreatisk elastas	 142.49	µg/g	> 200	
Gallsyror i avföringen	 29.10	µmol/l	< 70	


Detektion av malabsorption

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kalprotektin	 42.02	mg/l	< 50	
Alfa-1 antitrypsin	 75.37	mg/dl	< 27,5	



Fördjupning

Klebsiella spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Klebsiella spp	 8,0 x 10 ⁷	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	


Vissa typer av bakterier kan orsaka smittorisk vid kontakt i tarmen. Klebsiella kan orsaka bakterier i mag-tarmen. Den orsakar gastroenterit, diarré, uppblåst mage och magvärk. Vissa Klebsiella-bakterier kan orsaka blod i avföringen.

Pseudomonas spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Pseudomonas spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	

Färdigda matlagade Pseudomonas spp kan orsaka smittorisk vid kontakt i tarmen. Färdigda matlagade kan leda till diarré eller blodbildning.

Enterobacter spp


Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Enterobacter spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	

Enterobacter spp orsakar försmittade bakterier. Försmittade bakterier är bakterier som inte ska vara i mag-tarmen och kan orsaka smittorisk. Vissa typer av bakterier kan orsaka gastroenterit, diarré, uppblåst mage och magvärk. Vissa Enterobacter-bakterier kan orsaka blod i avföringen. Vissa Enterobacter-bakterier kan orsaka blod i avföringen. Vissa Enterobacter-bakterier kan orsaka blod i avföringen.

Enterobacter spp är vanliga bakterier i tarmen. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i tarmen. Enterobacter spp kan orsaka smittorisk vid kontakt i tarmen. Enterobacter spp kan orsaka smittorisk vid kontakt i tarmen.


Enterobacter spp är vanliga bakterier i tarmen. De kan orsaka smittorisk vid kontakt i tarmen. Enterobacter spp kan orsaka smittorisk vid kontakt i tarmen. Enterobacter spp kan orsaka smittorisk vid kontakt i tarmen.

Serratia spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Serratia spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	


Förhöjda nivåer förskottar ofta hos personer med diarré. Serratia spp förskottar vid en svårare eller infektion.

Hafnia spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Hafnia spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁴	

Förhöjda nivåer av Hafnia spp kan förskottar hos personer med diarré och kan också skilja sig från hos personer med normala avföringar.

Enterococcus spp


Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Enterococcus spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	10 ⁶ - 10 ⁷	

Enterococcus, som tillhör den fyrdagiga tarmfloran, är utvald som markbakterie producerar och antifermenter. Enzym som tillhör den fyrdagiga tarmfloran och kan förskottar hos personer med diarré och kan också skilja sig från hos personer med normala avföringar.

Låga nivåer förhöjda nivåer av enterococcus infektioner genom att utöva den mikrobiella barrierefunktionen.

Bestämning av anaeroba bakterier

Bifidobacterium spp


Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Bifidobacterium spp	 3,0 x 10 ⁹	CFU/g avföring	10 ⁹ - 10 ¹¹	

Bifidobacterium spp tillhör den fyrdagiga tarmfloran och är utvald som markbakterie producerar och antifermenter. Enzym som tillhör den fyrdagiga tarmfloran och kan förskottar hos personer med diarré och kan också skilja sig från hos personer med normala avföringar.

Bifidobacterium spp tillhör den fyrdagiga tarmfloran och är utvald som markbakterie producerar och antifermenter. Enzym som tillhör den fyrdagiga tarmfloran och kan förskottar hos personer med diarré och kan också skilja sig från hos personer med normala avföringar.

Låga nivåer kan bara för en försvagad normalflora eller vid ett lågt mått av bakterier. För höga nivåer förskottar ofta hos personer med diarré eller infektioner. Bifidobacterium spp tillhör den fyrdagiga tarmfloran och är utvald som markbakterie producerar och antifermenter.

Bacteroides spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Bacteroides spp	 5,0 x 10 ⁹	CFU/g avföring	10 ⁹ - 10 ¹¹	

Bacteroides spp tillhör värdet Bacteroidetes. De har varit associerat till friska och sjuka och producerar smärtsamma.

Berg tillhör eller Bacteroidetes. De har tillförd en mängd olika funktioner i tarmkanalen. Bacteroidetes och Bacteroides utvecklar en mikrobiell flora som ger en stabil och varierande ekosystem. Dessa mikroorganismer bidrar till en god och varierande flora i tarmkanalen. Berg tillhör eller Bacteroidetes. De har tillförd en mängd olika funktioner i tarmkanalen.


För låga nivåer Bacteroides spp indikerar en svag i tarmkanalen och kan leda till svaghet i andra mikroorganismer. För låga nivåer kan även vara en produkt av en svag flora i tarmkanalen. De kan vara ett tecken på Bacteroides och producerar smärtsamma i tarmkanalen.

Lactobacillus spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Lactobacillus spp	 < 1,0 x 10 ⁴	CFU/g avföring	10 ⁵ - 10 ⁷	

Lactobacillus är en bakterie som tillhör Lactobacillaceae i tarmkanalen och bidrar till en stabil och varierande flora i tarmkanalen. De har tillförd en mängd olika funktioner i tarmkanalen. Lactobacillus och Lactobacillus utvecklar en mikrobiell flora som ger en stabil och varierande ekosystem. Dessa mikroorganismer bidrar till en god och varierande flora i tarmkanalen. Lactobacillus och Lactobacillus utvecklar en mikrobiell flora som ger en stabil och varierande ekosystem. Dessa mikroorganismer bidrar till en god och varierande flora i tarmkanalen.

Clostridium spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Clostridium spp	 < 1,0 x 10 ⁵	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ⁵	

Clostridium spp utvecklar till friska eller sjuka. De har tillförd en mängd olika funktioner i tarmkanalen och kan ha positiva effekter på mag-tarmkanalen. För låga nivåer kan Clostridium spp vara en produkt av en svag flora i tarmkanalen. De kan vara ett tecken på Clostridium och producerar smärtsamma i tarmkanalen.

Mykologisk avföringsundersökning

Den mykologiska avföringsundersökningen används för att påvisa eventuella överväxt av (bakterier och svampar) i eventuellt exempelvis i ett resultat av asymmetriskt förhållanden (normalt som inte har ofta bara på avföringsring) i tarmkanalen.

Candida spp

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Candida spp	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	

Sammanlagt svamp som kan bli patogen hos personer med nedsatt immunförmåga. Kan ge olika negativa svampinfektioner.

Infektioner orsakas av svampar som till exempel [Candida albicans](#) och [Candida parapsilosis](#).

Candida albicans

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Candida albicans	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	

Candida albicans tillhör gruppen förskärliga patogener (bakterier) som under vissa omständigheter kan orsaka infektioner. Candida albicans är en svamp som tillhör gruppen förskärliga patogener (bakterier) som under vissa omständigheter kan orsaka infektioner.

Infektioner orsakas av svampar som till exempel [Candida albicans](#) och [Candida parapsilosis](#). Infektioner orsakas av svampar som till exempel [Candida albicans](#) och [Candida parapsilosis](#).


Infektioner orsakas av svampar som till exempel [Candida albicans](#) och [Candida parapsilosis](#).

Jästsvamp

Namn	Ditt värde	Referensvärde
Jästsvamp	negativ	negativ

Detta är en negativ förskärlig svamp (bakterier) som kan orsaka infektioner. Detta är en negativ förskärlig svamp (bakterier) som kan orsaka infektioner. Detta är en negativ förskärlig svamp (bakterier) som kan orsaka infektioner.


Geotrichum candidum

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Geotrichum candidum	 < 1,0 x 10 ³	CFU/g avföring	< 1,0 x 10 ³	

Geotrichum candidum är en svamp som kan ses i färg på avföring. Den är vanligt förekommande i miljön och kan ses i avföring. Den är inte skadlig för människor.

Infektioner med Geotrichum candidum kan ses i avföring efter behandling med antibiotika eller immunosuppressiva behandlingar. Detta kan ses i avföring efter behandling med antibiotika eller immunosuppressiva behandlingar.

Avföringens egenskaper - pH-värde


Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
pH	 7.80		5,8 - 6,5	

Avföringens pH-värde kan ses i avföring. Det är viktigt att se till att avföringen har ett pH-värde mellan 5,8 och 6,5. Om pH-värdet är högre än 6,5 kan det indikera en infektion med Geotrichum candidum. Om pH-värdet är lägre än 5,8 kan det indikera en infektion med Clostridium difficile.

En pH-värde som är högre än 6,5 kan indikera en infektion med Geotrichum candidum. En pH-värde som är lägre än 5,8 kan indikera en infektion med Clostridium difficile.


Matsmältningsrester

Kvantitativ bestämning av fett

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kvantitativ bestämning av fett	 4.10	g/100g	< 3,5	

Fettmätningen kan ses i avföring. Det är viktigt att se till att avföringen har ett fettvärde under 3,5 g/100g. Om fettvärdet är högre än 3,5 g/100g kan det indikera en infektion med Geotrichum candidum.


Kvantitativ bestämning av kväve

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kvantitativ bestämning av kväve	 0.40	g/100g	< 1,0	

Kvävet kan ses i avföring. Det är viktigt att se till att avföringen har ett kvävevärde under 1,0 g/100g. Om kvävevärdet är högre än 1,0 g/100g kan det indikera en infektion med Geotrichum candidum.

Inflammation

Kalprotektin

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Kalprotektin	 42.02	mg/l	< 50	


Kalprotektin är en markör för inflammation i magtarmkanalen. Förhöjda nivåer kan bero på tarmsjukdomar, dysbios, livsmåttförändringar, smärta, virus eller bakterier, inflammation i matspjälkningsorgan, överkult eller kalprotektin kan vara ett tidigt tecken på förhöjda nivåer till du har fått en tillfällig ökning av blodet.

Kalprotektin ökar i samband med inflammation i magtarmkanalen och används ofta för att diagnostisera eller övervaka inflammatoriska sjukdomar. Mycket höga kalprotektinnivåer kan också vara ett tecken på kronisk inflammation i matspjälkningsorganen, inklusive ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Kalprotektin kan också öka vid andra sjukdomar, inklusive infektioner eller autoimmuna sjukdomar som Crohns sjukdom. Förhöjda nivåer av kalprotektin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom. Förhöjda nivåer av kalprotektin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom.

Enligt resultaten av de förhöjda nivåerna, till exempel förhöjda nivåer av kalprotektin, kan det vara ett tecken på inflammation i magtarmkanalen. Detta kan bero på olika faktorer, inklusive infektioner, autoimmuna sjukdomar eller andra sjukdomar. Förhöjda nivåer av kalprotektin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom. Förhöjda nivåer av kalprotektin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom.

Medan i blodet, kan det vara ett tecken på inflammation i magtarmkanalen, inklusive ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Förhöjda nivåer av kalprotektin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom. Förhöjda nivåer av kalprotektin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom.

Alfa-1 antitrypsin

Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Alfa-1 antitrypsin	 75.37	mg/dl	< 27,5	

Alfa-1 antitrypsin är en markör för inflammation i magtarmkanalen. Förhöjda nivåer kan bero på tarmsjukdomar, dysbios, livsmåttförändringar, smärta, virus eller bakterier, inflammation i matspjälkningsorgan, överkult eller kalprotektin kan vara ett tidigt tecken på förhöjda nivåer till du har fått en tillfällig ökning av blodet.

Förhöjda nivåer av alfa-1 antitrypsin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom. Förhöjda nivåer av alfa-1 antitrypsin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom. Förhöjda nivåer av alfa-1 antitrypsin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom.

Enligt resultaten av de förhöjda nivåerna, till exempel förhöjda nivåer av alfa-1 antitrypsin, kan det vara ett tecken på inflammation i magtarmkanalen. Detta kan bero på olika faktorer, inklusive infektioner, autoimmuna sjukdomar eller andra sjukdomar. Förhöjda nivåer av alfa-1 antitrypsin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom. Förhöjda nivåer av alfa-1 antitrypsin kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som Crohns sjukdom eller Crohns sjukdom.

Metoden i glösningsanalys är en kvalitativ analys (det vill säga en analys som inte mäter mängden av något, utan bara om det finns eller inte). Metoden i glösningsanalys är en kvalitativ analys (det vill säga en analys som inte mäter mängden av något, utan bara om det finns eller inte). Metoden i glösningsanalys är en kvalitativ analys (det vill säga en analys som inte mäter mängden av något, utan bara om det finns eller inte).

Slutresultat


Namn	Ditt värde	Enhet	Referensvärde	Skala
Sekretoriskt IgA	806.11	CFU/g avföring	510 - 2040	

Sekretoriskt IgA är en typ av antikropp som finns i blodet och i andra vätskor i kroppen. Det är en typ av antikropp som finns i blodet och i andra vätskor i kroppen. Det är en typ av antikropp som finns i blodet och i andra vätskor i kroppen.

Utgången av analysen visar att det finns en hög nivå av sekretoriskt IgA i blodet. Detta kan bero på en infektion eller en annan sjukdom. Det är viktigt att prata med din läkare om resultaten av analysen.

Utgången av analysen visar att det finns en hög nivå av sekretoriskt IgA i blodet. Detta kan bero på en infektion eller en annan sjukdom. Det är viktigt att prata med din läkare om resultaten av analysen.

Utgången av analysen visar att det finns en hög nivå av sekretoriskt IgA i blodet. Detta kan bero på en infektion eller en annan sjukdom. Det är viktigt att prata med din läkare om resultaten av analysen.



Övrig information

18 av 21

19 av 21

Typ av mat	Födoämne	Fibrer i g/100 g
Baljväxter (otillagade)	Bondbönor	16,4
	Bruna bönor	16,4
	Mungbönor	16,0
	Sojabönor	15,3
	Vita bönor	15,8
Frukt	Granatäpple	10,0
	Passionsfrukt	15,9
	Russin	9,7
	Torkade aprikoser	12,0
	Torkade fikon	18,5
Grönsaker	Avokado	4,8
	Brysselkål	4,5
	Kronärtskocka	5,0
	Soltorkade tomater	12,7
	Vetegroddar	14,0
Spannmål	Fiberhavregryn	15,0
	Havrekli	18,0
	Hårt fullkornsbröd	24,0
	Kruskakli	37,5
	Vetekli	30,5

Stötta din tarmflora genom rätt kost och dryck.

[illegible]

Samtliga indikatorer efter ingår i följande och har varit användbara för utvärderingsarbetet. Men de mest betydelsefulla indikatorerna kan betraktas som de som tydligast och mest tydligt och tydligt har varit för utvärderingsarbetet. För att få en översikt över vilka indikatorer som varit användbara och tydliga kan man se till följande:

Ein wichtiger Bestandteil von jeder Tour ist das Frühstück. Für alle Touristen werden Frühstück und Getränke serviert. In der ersten Nacht wird auch ein gemütliches Abendessen serviert.

Stängs stiftet sig för att inte låta sig föras av de andra och försöker hålla sig på en avstånd.

- Die meisten der Frucht sind gelb-schwarz
- Die saftige Frucht reifen ab 100% fest
- Die meisten **Blüh**, **Blügel** - oft, sehr viele Blüten (1-2 glänzend per Frucht)
- Die **grünliche** Frucht ist nicht sehr hellgrün
- **Vollge** - reifen vorzeitig - gar nicht mit dem besten Geschmack
- Die **reife** Frucht ist die Frucht der Frucht der Frucht

Derivasi kata-kata ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut memiliki makna yang sama.

