



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE – *Inyecciones Sublocade*[®]

¿QUÉ ES SUBLOCADE[®]?

Sublocade es el nombre comercial de una forma inyectable de buprenorfina de **acción prolongada** que se utiliza para tratar el trastorno por consumo de opioides. Sublocade se administra a quienes iniciaron el tratamiento tomando una forma sublingual de buprenorfina como Suboxone. Las inyecciones de Sublocade están indicadas para controlar los síntomas de abstinencia y minimizar el riesgo de volver a consumir opioides ilícitos o peligrosos como la heroína o el fentanilo. Sublocade suele **aplicarse mensualmente**.

¿Cuáles son los beneficios de tratarse con inyecciones de Sublocade?

- Las inyecciones **sustituyen la necesidad de tomar medicación diaria**.
- **No hay riesgo de olvidarse de tomar la medicación o de perderla**.
- Tomar buprenorfina por vía sublingual lleva mucho tiempo y puede resultar incómodo. Las inyecciones mensuales **mejoran el seguimiento del plan de tratamiento**.
- Las inyecciones reducen el riesgo de caries dental que se asocia a la buprenorfina sublingual.
- Las inyecciones pueden proporcionar **mayores niveles de buprenorfina en la sangre** y un mejor bloqueo de la tolerancia a la droga en comparación con la buprenorfina sublingual.

¿Cuáles son los riesgos de administrarse inyecciones Sublocade?

- **Debería haber tomado antes una forma sublingual de buprenorfina** y haber descartado efectos adversos significativos antes de empezar a tomar Sublocade, ya que no puede eliminarse fácilmente del organismo.
- En raras ocasiones, Sublocade, como cualquier producto de buprenorfina, puede dañar su hígado. Debe realizarse análisis de sangre de manera periódica para comprobar **el funcionamiento de su hígado**.
- Consulte a su médico antes de tomar Sublocade si está **embarazada o en período de lactancia**. Informe a su médico si nota somnolencia o respiración lenta en el bebé lactante.
- Sublocade no puede dejar de administrarse inmediatamente y **puede bloquear el efecto de los analgésicos opioides**, lo que podría complicar el tratamiento del dolor agudo.
- Su organismo será **más sensible a los opioides** si los consume en el futuro. Utilizar la misma cantidad que antes puede provocar una sobredosis o la muerte.

¿Cómo se administra Sublocade?

- Sublocade se **inyecta debajo de la piel** una vez al mes (al menos 26 días entre inyecciones).
- Después de cada inyección, es posible que vea o sienta un pequeño bulto bajo la piel en el lugar donde se inyectó el medicamento. Puede durar varias semanas, pero el bulto se irá reduciendo gradualmente. Evite frotar o masajear el bulto o llevar ropa ajustada sobre la zona afectada.



Equipo de atención de enfermería

Si tiene alguna reacción o efecto secundario que cree que puede deberse a Sublocade, puede ponerse en contacto con un profesional de enfermería en **cualquier momento** (disponible 24 horas del día, 7 días a la semana) llamando al 1-877-522-1275 (pulse #1, luego #6).

LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

Le recomendamos que llame al 911 o acuda al Servicio de Emergencia más cercano ante cualquiera de los siguientes síntomas mientras recibe inyecciones de Sublocade.

- Respiración débil o poco profunda, o respiración que se detiene durante el sueño.
- Somnolencia o mareos intensos, o pérdida de coordinación.
- Dolor, enrojecimiento, picazón o cambios en la piel en el lugar donde se aplicó la inyección.
- Síntomas de abstinencia de opioides como escalofríos, piel de gallina, aumento de la sudoración, diarrea o vómitos.
- Indicios de problemas hepáticos como dolor de estómago, orina oscura o ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos).
- Indicios de niveles bajos de cortisol como náuseas, pérdida de apetito, mareos o empeoramiento del cansancio o la debilidad.
- Agitación, alucinaciones, fiebre, escalofríos, taquicardia, rigidez muscular o espasmos.

RECORDATORIOS

- **Consulte antes de empezar a tomar nuevos medicamentos.** Hable con su médico antes de empezar a tomar cualquier medicamento nuevo mientras esté en tratamiento con inyecciones de Sublocade.
- **Evite conducir o realizar actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afectará este medicamento.**
- **Use Narcan o Kloxxado en caso de sobredosis.** En primer lugar, llame al 911. A continuación, introduzca suavemente la punta de la boquilla del atomizador en una fosa nasal hasta que los extremos de la boquilla queden apoyados en la parte inferior de la nariz de la persona. Presione firmemente el émbolo para administrar la dosis del atomizador nasal. Retire el atomizador nasal de la fosa nasal después de administrar la dosis. Repita la operación cada 2-3 minutos hasta que la persona responda.
- **Las reacciones adversas entre medicamentos pueden ser peligrosas. El uso de opioides, incluida la buprenorfina, con alcohol o sedantes como las benzodiacepinas (Xanax, Ativan, Valium), medicamentos para el dolor nervioso (Lyrica, Gabapentin) y medicamentos recetados para dormir (Ambien, Lunesta) puede aumentar el riesgo de depresión respiratoria, que puede causar la muerte.**