


Prise en charge des vascularites urticariennes hypocomplémentémiques

Diagnostic de VUH (1+2+3)



Urticaire chronique



Vascularite
leucocytoclasique


3 Hypocomplémentémie (C3 et/ou C4)

Lésions cutanées

Prurit	60%
Douleur	10%
Hyperpigmentation	20%
>50% du corps	80%
Durée >24 heures	90%
Angioedème	50%

Manifestations extra-cutanées

Femmes	75%
Age médian	45 (15-83)
VUH isolée	75%
VUH associée à d'autres maladies	25%



**Uvéïte/Episclérite
50%**

**Atteinte
pulmonaire 20%**

**Douleurs
abdominales 20%**

**Glomérulonéphrite
15%**

**Arthralgies
80%**

Paramètres biologiques

Baisse du C1q	90%
Baisse du C1 inhibiteur	0%
Anticorps anti-C1q	50%
Anticorps anti-nucléaires (anti-SSA +++, DNA ++)	50%

Prise en charge thérapeutique

1^{ère} ligne

Hydroxychloroquine,
colchicine ou disulone

2^{ème} ligne

Corticoïdes <0.5
mg/kg/jour

Maladie en rechute
et/ou réfractaire

Azathioprine, MMF,
cyclophosphamide

Alternatives
thérapeutiques

Rituximab, anti-IgE,
anti-IL-1