

1) Manifestations cliniques évocatrices

- Vascularite la plus fréquente chez l'enfant, avec une incidence annuelle de 3 à 26 pour 100 000 enfants, et survenant le plus souvent entre 4 et 7 ans
- Rare chez l'adulte, avec une incidence annuelle de 0,1 à 1,8 pour 100 000 individus
- **Manifestations cliniques :**
 - **Purpura palpable**, surtout sur les zones de pressions (parfois nécrotique ou hémorragique)
 - **Arthralgies** dans 2/3 des cas
 - **Manifestations gastro-intestinales** dans 2/3 des cas: douleurs abdominales +++, complications sévères possibles (perforation, invagination, hémorragie digestive)
 - **Atteinte rénale** survenant dans 45 à 85%, le plus souvent sous la forme d'une hématurie
- Élévation des IgA sériques dans 50%



2) Présence d'une vascularite avec dépôts prédominant d'IgA1, touchant les vaisseaux de petit calibre (capillaires, artérioles, ou veinules)

- Vascularite leucocytoclasique avec dépôts prédominant d'IgA au niveau des vaisseaux, principalement des veinules post-capillaires, mais aussi des veines et artérioles de la peau
- Dépôts d'IgA parfois difficiles à mettre en évidence, en particulier dans la peau
- Pathologie systémique, prédominant à la peau ou même limitée à la peau (vascularite limitée à un organe)

