Vascularite à IgA

Une vascularite avec des dépôts d'IgA

Maladie décrite en 1802 par Heberden puis par Schönlein en 1837 sur l'association d'un prupura avec arthralgies

Ajout par Hensch des atteintes gastro-intestinale en 1874 et rénale en 1899

Epidémiologie

Incidence chez l'enfant : 3-26/100 000 (4-7 ans)

Incidence chez l'adulte : 0,1-1,8/100 000

Vascularite avec dépôts prédominant d'IgA1, touchant les vaisseaux de petit calibre (capillaires, veinules, ou artérioles)
Atteignant souvent la peau, le tube digestif et les articulations
Atteinte glomérulaire indistinguable de la néphropathie à IgA

La clinique, la biologie, le pronostic en 1 diapositive

**Un quatuor clinico-biologique
ura + arthralgies + douleurs abdominales
+ glomérulonéphrite**

**Pas de marqueur biologique spécifique : IgA élevés dans 50%
(mais aussi dans cirrhose, MICI, certaines infections, spondyloarthrite, ...)**

Pronostic

Sévérité chez l'adulte >>> enfant

Rechutes/chronicité chez 20-30%

Pronostic à court-terme lié à l'atteinte digestive

Pronostic à long-terme lié à l'atteinte rénale

(10-20% d'insuffisance rénale terminale à 5 ans)

Audemard-Verger, Arthritis Rheumatol, 2017

Coppo, AJKD, 2006

Pillebout, J Am Soc Nephrol, 2002

Coppo, Nephrol Dial Transplant, 1997

Purpura pétéchiâl

Images : Pr Nicolas Dupin (Cochin)

Purpura pétéchial de l'abdomen et des membres supérieurs

Images : Dr Marie Jachiet (Saint-Louis)

Purpura confluent en placards $\pm$ ecchymotiques

Images : Dr Marie Jachiet (Saint-Louis)

Purpura confluent avec centre nécrotique

Images : Dr Marie Jachiet (Saint-Louis)

Purpura bulleux avec centre nécrotique

Images : Dr Marie Jachiet (Saint-Louis)

Images : Dr Marie Jachiet (Saint-Louis)

Lésions en cible

Images : Dr Benjamin Terrier (Cochin)

Lésions en cible

Vascularite leucocytoclasique

Images : Dr Pierre Sohier (Cochin)

Leucocytoclasie

Vascularite leucocytoclasique

Dépôts d'IgA et de C3 dans la paroi vasculaire

IF à faire sur lésions fraîches +++ (<48 heures)

Images : Dr Pierre Sohier (Cochin)

Une néphropathie glomérulaire à IgA

Indistinguable de la néphropathie à IgA (NIgA)

NIgA : 0,6 à 2% des glomérulopathies de l'adulte

Néphropathie glomérulaire dans 45-85 % chez l'adulte
des vascularites à IgA (VIgA) (vs. 20-54% chez l'enfant)

Signe le plus fréquent et précoce: **Hématurie microscopique**

Protéinurie de débit variable, parfois néphrotique

Insuffisance rénale au diagnostic présente dans 25-30%
des cas de l'adulte (vs. <10% chez l'enfant)

Manifestations rénales	Enfants (%)	Adultes (%)
Hématurie macroscopique	42	22
Hématurie microscopique	33	75
Protéinurie	62	55
Syndrome néphrotique	21	19
Insuffisance rénale	8	25
Hypertension artérielle	14	27

Ponction-biopsie rénale

Triple intérêt

Intérêt diagnostique

Intérêt pronostique

Intérêt thérapeutique

Qui biopsier ?

- Protéinurie >1 g/j
- Insuffisance rénale
- Syndrome de GNRP

Hyperplasie avec hypertrophie mésangiale

Images : Dr Marion Rabant (Necker)

**Hypercellularité
endo-capillaire**

**Croissant cellulaire
= Prolifération extra-capillaire**

Croissant cellulaire

Croissant cellulaire

Glomérule normal

Lésions très variables d'un glomérule à l'autre et d'un patient à l'autre

Du glomérule normal

À l'hyperplasie mésangiale

Hypercellularité endo-capillaire

Prolifération extra-capillaire, cellulaire ou fibrocellulaire

Lésions segmentaires fibreuse ou croissant fibreux

Croissant cellulaire avec rupture de la membrane basale glomérulaire

Croissant cellulaire

Dépôts mésangiaux d'IgA

Immunofluorescence directe

Dépôts mésangiaux d'IgA

Dépôts de C3 fréquemment associés

Dépôts mésangiaux de fibrine plus fréquents dans la VlgA que dans la NIgA
(évoqueurs de VlgA)

Une attention toute particulière sur le tube digestif

Atteinte digestive dans 50%, à type de douleurs abdominales dans 99%

Possible hémorragie digestive occulte, plus rarement sévère

Formes graves (transfusions, chirurgie, décès) dans moins de 10%

Characteristic	n (%)
----------------	-------

Radiological features^a

CT scan and/or abdominal US	90
Normal	35 (39)
Thickening of intestinal wall	55 (61)
Intestinal dilatation	6 (7)
Submucosal hematoma	2 (2)
Intramural hematoma	1 (1)
Pancreatitis	1 (1)

Endoscopic features

Upper and/or lower GI endoscopies	78
Normal	10 (13)
Ulceration	43 (55)
Mucosal erythema	27 (35)
Mucosal purpura	21 (27)

Characteristic	n (%)
----------------	-------

Clinical manifestations

Abdominal pain	135 (99)
Bleeding	43 (31)
Diarrhoea	36 (26)
Nausea or vomiting	26 (19)
Paralytic ileus	13 (9)
Surgical abdomen	6 (4)

Les drapeaux rouges du tube digestif

213 patients avec vascularite digestive de toute cause
Facteurs prédictifs de gravité ?

39%
Evolution compliquée

Vascularite à IgA
plutôt de bon
pronostic

32%
Réanimation

20%
Chirurgie

15%
Sepsis

8%
Décès

Facteurs associés à évolution compliquée

PAN

Iléus

↗ GB

PS élevé

Méléna

↗ CRP

Morphine

Défense

↘ Hb

Une maladie des dépôts tissulaires d'IgA1

Dépôts d'IgA dans la paroi des vaisseaux et capillaires de la peau

Vascularite des vaisseaux de petit calibre

Dépôts d'IgA dans le mésangium des glomérules rénaux

Prolifération mésangiale et endocapillaire

Dépôts d'IgA dans la paroi des vaisseaux et capillaires du tube digestif

Souffrance des anses intestinales et hémorragie digestive

Une maladie des dépôts tissulaires d'IgA1

Dérégulation de la synthèse et du métabolisme des IgA1

Probablement déclenchée par une exposition à un antigène environnemental (pic automnal et hivernal chez les enfants +++)

Favorisée par une prédisposition génétique (HLA-DQB1 et HLA-DRB1)

Flynn, Scand J Rheumatol, 2011
Davin, Nat Rev Nephrol, 2014
Ostini, J Clin Rheumatol, 2016

Une maladie des dépôts tissulaires d'IgA1

**Excès de production au niveau des muqueuses
ou MO ET/OU défaut de clairance des IgA1
déficients en galactose (représentant
habituellement une minime proportion +++)**

Une maladie des dépôts tissulaires d'IgA1

**Excès de production au niveau des muqueuses
ou MO ET/OU défaut de clairance des IgA1
déficients en galactose (représentant
habituellement une minime proportion +++)**

**↑ des complexes immuns
contenant des IgA1 exposant
N-acétyl galactosamine
(GalNAC) (trigger viral ?)**

Fixation des IgA1-GalNAC au récepteur myéloïde Fcα1R/CD89 (PNN +++) mais surtout à leur récepteur mésangial TfR/CD71

Galactose-deficient IgA1

Une maladie des dépôts tissulaires d'IgA1

**Excès de production au niveau des muqueuses
ou MO ET/OU défaut de clairance des IgA1
déficients en galactose (représentant
habituellement une minime proportion +++)**

**↑ des complexes immuns
contenant des IgA1 exposant
N-acétyl galactosamine
(GalNAC) (trigger viral ?)**

**Fixation des IgA1-GalNAC au récepteur myéloïde Fcα1R/CD89 (PNN +++)
mais surtout à leur récepteur mésangial TfR/CD71**

Activation des voies des lectines et alterne du complément

**Inflammation glomérulaire
Activation des cellules mésangiales
(prolifération, MEC)**

Galactose-deficient IgA1

Traquer les formes secondaires

1. Traquer la **néoplasie solide** (adénocarcinomes ou cancers urothéliaux) : surtout si sexe masculin, âge >50-60 ans et purpura nécrotique

Hankard, Clin Rheumatol, 2021

2. Traquer les **médicaments inducteurs/déclencheurs** : anti-TNF-alpha (pour MICI +++), vaccins (tous ou presque), antibiotiques (amoxicilline, clarithromycine)

Rasmussen, Autoimmun Rev, 2021

3. Traquer la **gammapathie monoclonale IgA** : petit pic, grosses conséquences, gros traitement

Paule, Autoimmun Rev, 2020

Vignon, Kidney Int, 2017

4. Autres causes secondaires : cirrhose (OH +++), MICI, leucémie à tricholeucocytes, autres (SPA, ...)

Rasmussen, Rheumatology, 2022

Joher, Nephrol Dial Transplant, 2021

Elhani, J rheumatol, 2021

Attention aux pièges

Femme, 53 ans

ATCD de RCH sous infliximab

**Première impression clinique :
Vascularite à IgA**

Attention aux pièges

Femme, 53 ans

ATCD de RCH sous infliximab

Bilan immuno

ANCA-PR3 +++

Première impression clinique :
Vascularite à IgA

Deuxième
impression :

Attention aux pièges

Femme, 53 ans

ATCD de RCH sous infliximab

Première impression clinique :
Vascularite à IgA

Bilan immuno

ANCA-PR3 +++

Deuxième
impression :

Vascularite à IgA finalement retenue

Biopsies cutanées :

1. Vascularite leucocytoclasique sans dépôt → vascularite à ANCA
2. Dépôts IgA et C3 dans les capillaires du derme superficiel → vascularite à IgA

Paresthésies des membres supérieurs

EMG : mononeuropathie multiple
sensitive dans les territoires ulnaire et
médian G et musculo-cutané D

IRM médullaire : cervicarthrose

Hématurie microscopique

Biopsie rénale : Glomérulonéphrite à
dépôts mésangiaux et endo-capillaires
d'IgA, C3 et fibrinogène

Vascularite à IgA et ANCA

ANCA-Associated Crescentic Glomerulonephritis With Mesangial IgA Deposits

6 patients atteints de GN à croissants avec dépôts
mésangiaux d'IgA et ANCA positifs (PR3 chez 4,
MPO chez 1, double positif chez 1)

Vascularite systémique dans 3/6

Biopsie rénale :

- **Croissants dans >50 % des glomérules**
- **Hypercellularité mésangiale et endo-capillaire
légère**

Syndrome de chevauchement ?

Agressivité et évolution plus proche des vascularites
à ANCA

**Des liens existent entre
vascularite à IgA et ANCA**

**Vascularite à IgA avec
ANCA positifs
ou encore**

**Vascularite à ANCA avec
dépôts mésangiaux d'IgA**

**Dans ces situations, la
présentation clinique et
évolutive semble devoir
être l'élément le plus
important**

Prise en charge thérapeutique

On ne sait pas bien, personne n'est d'accord, c'est le flou intégral

Principaux généraux

Repos pour limiter l'extension du purpura

Antalgiques si douleurs

AINS contre-indiqués en cas d'atteinte digestive ou rénale

Mesures de néphroprotection si atteinte rénale :
IEC ou ARA2 pour contrôle de la pression artérielle
et diminution de la protéinurie

Recommandations KDIGO 2021

- 1. Pas de glucocorticoïdes pour prévenir une atteinte rénale en cas de VlgA en cas d'atteinte extra-rénale**
- 2. Objectif de pression artérielle : PAS <120 mmHg**
- 3. IEC ou ARA2 à dose maximale en cas de protéinurie >0,5 g/j**
- 4. Participation aux essais cliniques +++**
- 5. Si indication de corticothérapie, suivre un schéma identique à la NlgA (durée 6-9 mois, schéma essai TESTING)**
- 6. Si tableau de GNRP, suivre les recommandations des vascularites à ANCA**

Traitement de l'atteinte cutanée

Colchicine

Inhibition du chimiotactisme des PNN sur le site inflammatoire, de la fonction du cytosquelette et de la fusion lysosomale

Efficacité au cours de la maladie de Behçet et FMF

Efficacité rapportée dans 80% au cours des vascularites leucocytoclasiques

Dapsone

Utilisée dans de nombreuses maladies dermatologiques neutrophiliques

Bonne « experience-based medicine »

PHRC COLCHIVAS

« Efficacy of colchicine to prevent skin relapses in adult's IgA vasculitis »
E. Pillebout, A. Audemard-Verger

Etude ARAMIS

Vascularites cutanées
Colchicine vs. Dapsone vs. azathioprine
C. Pagnoux

Callen, Am Acad Dermatol, 1985

Pyne, Rheumatology, 2001

Padeh, Isr Med Assoc J, 2000

Chen, Am J Clin Dermatol, 2008

Traitement de l'atteinte digestive

Formes bénignes

Traitements symptomatiques

Colchicine, dapsone ou faibles doses de glucocorticoïdes

Formes sévères

Corticothérapie à fortes doses ± immunosuppresseurs (CYC ou RTX ?)

Essai CESAR
Evaluation du
cyclophosphamide
E. Pillebout

Kidney Int, 2010

Essai RIGA
Evaluation du
rituximab
R. Paule

PHRC en cours

Traitement de l'atteinte rénale

Formes minimales (hématurie, protéinurie <0,5 g/j)

Surveillance +++

Formes modérées (protéinurie >0,5 g/j, DFG normal)

IEC ou ARA2 à dose maximale

Objectif de pression artérielle : PAS <120 mmHg

Formes sévères (DFG <60 ml/min, GNRP)

Corticothérapie à fortes doses ± immunosuppresseurs (CYC ou RTX ?)

Essai CESAR
Evaluation du
cyclophosphamide
E. Pillebout

Essai RIGA
Evaluation du
rituximab
R. Paule

Quelle place pour le cyclophosphamide ?

Addition of cyclophosphamide to steroids provides no benefit compared with steroids alone in treating adult patients with severe Henoch Schönlein Purpura

Evangéline Pillebout¹, Corinne Alberti², Loic Guillevin³, Amel Ouslimani⁴ and Eric Thervet⁵, the CESAR study group⁶

Critère de jugement principal atteint chez 3 patients dans chaque groupe : 3/29 (10,3%) dans le bras GCs versus 3/25 (12,0%) dans le bras GCs+CYC (P = 1,00)

54 patients inclus sur 200 nécessaires

Atteinte digestive (54%), DFGe <60 ml/min (43%)

Critère de jugement principal : rémission complète (BVAS=0) à 6 mois

Quelle place pour le cyclophosphamide ?

Etude rétrospective IGAVAS sur 260 patients adultes avec VIgA

Comparaison de l'efficacité de GCs (+/- CYC) versus colchicine seuls selon plusieurs modèles

Comparaison de l'efficacité de GCs+CYC versus GCs seuls selon plusieurs modèles

GCs seuls semblant être un traitement de 1^{ère} intention raisonnable chez les patients avec vascularite à IgA

Intérêt d'adjoindre du CYC restant incertain

Quelle place pour le rituximab ?

22 patients

Peau (96%), rein (91%), tube digestif (82%),

91% atteignant la rémission clinique à 12 mois

Réduction significative de la protéinurie, du BVAS et de la corticothérapie à 12 mois

Bonne tolérance

	Time relative to RTX treatment			
	Baseline (n = 22)	Month 1 (n = 22)	Month 6 (n = 22)	Month 12 (n = 22)
Active organ involvement				
Skin	18 (81.8)	5 (22.7)	1 (4.5)	3 (13.6)
Gastrointestinal	15 (68.2)	0	2 (9.1)	1 (4.5)
Kidney	18 (81.8)	13 (59.1)	3 (13.6)	3 (13.6)
Joint (arthritis/arthritis)	16 (72.7)	4 (18.2)	2 (9.1)	1 (4.5)
BVAS, median (IQR)	15.0 (9.5–19.8)	6.0 (4.5–8.5)	5.0 (4.5–10.5)	5.0 (1.5–8.0)
Estimated GFR, median (IQR) ml/minute/1.73 m ² †	82.0 (65.0–101.0)	92.0 (54.0–98.5)	78.0 (66.2–90.7)	77.0 (60.0–106.0)
Proteinuria, median (IQR) mg/24 hours	1,700 (750–2,375)	1,730 (618–3,708)	479 (150–3,000)	493 (100–1,000)
Concomitant immunosuppressive treatments				
Glucocorticoids and/or immunosuppressants	16 (72.7)	11 (50.0)	6 (27.3)	4 (18.2)
Glucocorticoids	15 (68.2)	11 (50.0)	6 (27.3)	4 (18.2)
Immunosuppressants‡	7 (31.8)	5 (22.7)	4 (18.2)	4 (18.2)
Patients taking ACE inhibitors and/or ARBs	8 (36.4)	5 (22.7)	4 (18.2)	4 (18.2)
Patients with disease in remission	–	10 (45.5)	16 (72.7)	16 (72.7)

Etude ouverte négative dans la NlgA

*Maritati, Arthritis Rheumatol, 2018
Lafayette, JASN, 2017*

Essai français RIGA (PHRC national 2019)

Critère de jugement principal :

% de patients en rémission (BVAS adapté et prednisone à 0 mg/j)

Nombre de sujets : 72 patients, soit 36 patients par bras

Investigateur coordonnateur : Romain Paule (Foch)

Proposition pour le traitement de l'atteinte rénale

	Protéinurie <1 g/j	Protéinurie 1-3 g/j	Protéinurie >3 g/j
GN mésangiopathique	IEC ou ARA2	IEC ou ARA2	IEC ou ARA2 + GCs
GN segmentaire et focale	IEC ou ARA2	IEC ou ARA2 ± GCs	IEC ou ARA2 + GCs
GN endo-capillaire diffuse	IEC ou ARA2	IEC ou ARA2 + GCs	IEC ou ARA2 + GCs
GN endo- et extra- capillaire	IEC ou ARA2 + GCs	IEC ou ARA2 + GCs ± CYC	IEC ou ARA2 + GCs + CYC
Sclérose glomérulaire	Traitement conservateur	Traitement conservateur	Traitement conservateur

Conclusion

Vascularite à dépôts de complexes immuns par « IgAmopathie »

Purpura + arthralgies + douleurs abdominales + glomérulonéphrite

Formes de l'adulte plus rares mais plus sévères

Pronostic à court-terme lié à l'atteinte digestive, pronostic à long-terme lié à l'atteinte rénale

Perspectives thérapeutiques très nombreuses ciblant à la fois la production/clairance des IgA et les dommages tissulaires

Remerciements

GFEV | GROUPE FRANÇAIS
D'ÉTUDE DES
VASCULARITES

Loic Guillevin
Xavier Puéchal
Luc Mouthon
Stanislas Faguer
Noémie Jourde-Chiche
Alexandre Karras
Camile Taillé
Vincent Cottin
Maxime Samson
Antoine Néel
Grégory Pugnet

Pierre Sohier
Nicolas Dupin
Selim Aractingi

Romaine Paule
Aurélie Barbier-Stanislas

Marie Jachiet
Evangeline Pillebout

Investigateurs protocole RIGA

Dominique Chauveau
Noémie Jourde-Chiche
Olivier Moranne
Antoine Néel
Rodérau Outh

**MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Alexandra
Audemard-Verger

Marion Rabant
Jean-Paul Duong

INSERM U970
Pierre-Louis Tharaux
Olivia Lenoir
Alexandre Karras