

Critères 2022 de classification ACR/Alliance Européenne des Associations de Rhumatologie pour la granulomatose avec polyangéite
--

Ces critères de classification ne doivent être appliqués qu'après :

- établissement d'un diagnostic de vascularite des petits ou moyens vaisseaux
- et élimination des diagnostics différentiels

Critères cliniques	
atteinte nasale : écoulement sanglant, ulcération, croûtes, congestion, obstruction, ou perforation septale	+3
atteinte cartilagineuse : inflammation du cartilage nasal ou de l'oreille, voix rauque ou stridor, atteinte endobronchique, ou ensellure nasale	+2
perte auditive de conduction ou neurosensorielle	+1
Données biologiques, d'imagerie ou anatomo-pathologiques	
cANCA ou ANCA-PR3+	+5
nodules pulmonaires, masse, ou cavité à l'imagerie thoracique	+2
granulome, inflammation granulomateuse extravasculaire, ou cellules géantes à la biopsie	+2
inflammation, opacité, ou épanchement des sinus, ou mastoïdite à l'imagerie	+1
glomérulonéphrite pauci-immune à la biopsie	+1
pANCA ou ANCA-MPO+	-1
éosinophilie $\geq 1 \times 10^9/l$	-4

La somme du score sur ces 10 items doit être ≥ 5 pour classer le patient comme ayant une granulomatose avec polyangéite.