

Gestion de l'anticoagulation péri-procédures:

FAG / VMPC / MITRACLIP® / TRICLIP® / TMVI/R / FFPP

Avant

Pendant

Après**

Cible ACT > 250 sec

ACT toutes les 30'

+ 30 UI/kg si ACT < 250s

* En l'absence de complication hémorragique

* Sauf FAG

AVK

Ne pas arrêter

Adapter pour objectif : **1,8 < INR < 3**
le jour de la procédure

Pas de relais HNF/HBPM

si INR < 2 : HNF 100 UI/kg

si INR > 2 : HNF 70 UI/kg

si INR > 3 : HNF 50 UI/kg

Reprise AVK **dose habituelle le soir**
de la procédure

AOD

**Pas de prise la veille au soir et le
matin** de la procédure

Pas de relais HNF/HBPM

Pas de dosage

HNF 100 UI/kg

Reprise AOD **le soir (> H+6)** de la
procédure

Conditions :

Ponction veineuse écho-guidée

Ponction trans-septale ETO-guidée

Gestion de l'anticoagulation péri-procédures:

TAVI

Avant

Pendant

Après*

AVK

Ne pas arrêter

Adapter pour objectif : **1,8 < INR < 3**
le jour de la procédure
Pas de relais HNF/HBPM

si INR < 2 : HNF 50 UI/kg
si INR > 2 : HNF 40 UI/kg
si INR > 3 : HNF 30 UI/kg

* *En l'absence de complication hémorragique*

Reprise AVK **dose habituelle le soir**
de la procédure

AOD

**Pas de prise la veille au soir et le
matin** de la procédure
Pas de relais HNF/HBPM
Pas de dosage

HNF 50 UI/kg

Reprise AOD **le soir (> H+6)** de la
procédure

Conditions :
Ponction vasculaire écho-guidée